

UPOZORENJE

NOVI I OPASNI NEPRIJATELJ PALMI

Rhynchophorus ferrugineus



Crveni surlaš palmi

Odrasle jedinke crvenog palminog surlaša

SIMPTOMI



TIPIČAN
SIMPTOM NAPADA
JE „KLONULOST
LISTOVA“ TAKO
DA CIJELA PALMA
IZGLEDA KAO
KIŠOBRAN



SIMPTOM
„HODNICI I
TENELI“
NASTAJE
ISHRANOM
LARVI U
OSNOVI
NAJMLAĐEG
LIŠĆA



U STABLU PALME ISTOVREMENO SE MOGU NAĆI RAZLIČITI STADIJUMI RAZVIĆA (LARVA, LUTKA U KOKONU, IMAGO)

ŠTA URADITI: POZIVAJU SE SVI GRAĐANI DA UKOLIKO PRIMIJETE POJAVU ILI SUMNJU O PRISUSTVU OVOG VEOMA ŠTETNOG ORGANIZMA PALMI DA ODMAH OBAVIJESTE OPŠTINSKE NADLEŽNE SLUŽBE, UPRAVU ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE ILI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA.

NEMOJTE SAMI UKLANJATI ILI UNIŠTAVATI NAPADNUTE DJELOVE PALMI.

REZIDBA PALMI??? REZIDBA PALMI U PERIODU OD MARTA DO DECEMBRA PRIVLAČI CRVENOG SURLAŠA I POVEĆAVA RIZIK OD NAPADA.

KONTAKT: Tel: +382 20 201 945 Fax: +382 20 201 946
E-mail: upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me